

Représentation par les patientes et leurs médecins rhumatologues du traitement médicamenteux anti-ostéoporotique : résultats préliminaires

Laura Lepage (Doctorante, 3^e année) & Fabienne Lemétayer (Directrice de thèse)

Université de Lorraine - APEMAC

CONTEXTE

- L'ostéoporose est une maladie chronique osseuse, fréquente chez les femmes ménopausées, le plus souvent asymptomatique, jusqu'à ce qu'une première fracture apparaisse.
- L'observance des traitements médicamenteux anti-ostéoporotiques reste cependant complexe et diminue au fil du temps (Boonen et al., 2008).
- Les rhumatologues quant à eux se préoccupent de la progression de la maladie en raison de cette non-observance médicamenteuse.

METHODE

Population

PATIENTES OSTÉOPOROTIQUES (n = 4)

Agées de 50 ans et plus, Sous traitement anti-ostéoporotique depuis au moins 6 mois.

MEDECINS-RHUMATOLOGUES (n = 4)

Suivi des 4 patientes atteintes d'une ostéoporose post-ménopausique.


Entretiens semi-structurés (n = 8)

- Elaboration d'un guide d'entretien
- Enregistrés et intégralement retranscrits
- Analyse thématique de contenu (NVivo 10)


OBJECTIF

Examiner les représentations des traitements anti-ostéoporotiques auprès des patientes et de leurs médecins

RESULTATS



Graphique 1 : Représentations des traitements anti-ostéoporotiques par les patientes et leurs médecins-rhumatologues.



Graphique 2 : Les facteurs influençant la prise médicamenteuse par les patientes et leurs médecins-rhumatologues.

DISCUSSION

- Globalement, les traitements ostéoporotiques suscitent plus de représentations négatives chez les patientes ostéoporotiques que leurs médecins-rhumatologues, concernant plus particulièrement les croyances sur les effets indésirables potentiels.
- Pour les patientes, le mode d'administration et l'incertitude vis-à-vis des traitements peuvent compliquer leur suivi du traitement. Concernant les rhumatologues, les informations erronées facilement accessibles via les médias et les réseaux sociaux contribuent à compliquer l'observance du traitement.
- Une des difficultés rencontrées par les professionnels de santé pour faire respecter le traitement est la défiance des patientes à l'égard de celui-ci, laquelle est difficilement appréhendable par les rhumatologues qui ont peu de retours d'expérience des patientes.

REFERENCES

- Attar, H. S., & Chandramani, S. (2012). Impact of physician empathy on migraine disability and migraineur compliance. *Annals of Indian Academy of Neurology*, 15(Suppl 1), S89.
- Kendler, D. L., Macarios, D., Lillestol, M. J., Moffett, A., Satram-Hoang, S., Huang, J., ... & Horne, R. (2014). Influence of patient perceptions and preferences for osteoporosis medication on adherence behavior in the Denosumab Adherence Preference Satisfaction study. *Menopause*, 21(1), 25-32.

Laura Lepage

Contact : laura.lepage@univ-lorraine.fr

Poster présenté au 11^{ème} congrès de

AFPSA Association Francophone de Psychologie de la Santé