

L'annonce d'une résistance aux traitements anti-cancéreux : vécu et perception des pédiatres oncologues

Johanna Terrasson, Aude Rault, Sylvie Dolbeault, Étienne Seigneur & Anne Brédart




La résistance désigne les traitements anticancéreux qui n'atteignent pas ou plus les effets thérapeutiques escomptés (INCa, 2014)*

Objectif : Appréhender le vécu et la perception de cette annonce par les pédiatres oncologues afin de mieux comprendre les enjeux de la communication lors de l'annonce de cette résistance


*INCa. Mon enfant a un cancer : comprendre et être aidé. Cancer Info. 2014.

Méthode

- Entretiens semi-structurés auprès des pédiatres oncologues :
 - Spécificités de l'annonce de résistance au traitement
 - Comparaison avec l'annonce du diagnostic
- Analyse de contenu thématique *via* le logiciel RQDA®



15 pédiatres



Résultats

- **Fortes difficultés émotionnelles** associées à l'annonce de résistance ($n = 12$)
- **Sentiment d'un échec personnel et/ou de la médecine** ($n = 5$)
- Dans les situations de pronostic sombre, les pédiatres expriment devoir, eux-aussi, **faire le deuil d'une guérison possible de l'enfant** ($n = 6$)

À l'annonce de la résistance, comparativement au diagnostic ...

Posture optimiste altérée

Majoration des difficultés émotionnelles liée à la connaissance de la famille

Incidence de l'histoire de la maladie et du parcours de soins

Moins d'alternatives thérapeutiques disponibles

« C'est des situations qui nous affectent beaucoup »

« Nous aussi on fait un deuil »

« Toute annonce est violente et brutale, mais l'annonce de la résistance, moi encore je le vis, je le vis plus difficilement probablement que l'annonce diagnostic [...] parce que c'est des familles que je connais déjà »

Conclusion

L'annonce d'une résistance au traitement représente un moment particulièrement difficile pour les pédiatres, accentué par le lien affectif aux familles.

La charge émotionnelle de ces annonces doit nous amener à réfléchir aux modalités de soutien individuel et collectif pouvant être proposées aux pédiatres.